

ACCORD

Anbauempfehlung



**Verwendung: Pommes/Frisch
Früh verwendbar**

Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	LG
Fleischfarbe	4.5
Knollenform	RO/O
Augentiefe	7.5
Gleichmäßigkeit der Knollenform	8
Knollengröße	8
Sortierung	8
Trockenstoffgehalt	21
Speisequalität	7BC/C
Keimruhe	5

Erklärung:


9=positiv 1=negativ
 Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
 Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:


Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	25	53,3
35/50	34	39,2
35/55	37	36,0
50/55	38	35,1
50/60	40	33,3

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Lagerung:



7 °C
4 Monate

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	8.5
X-Virus	9.5
Y-Virus	8
Yntn-virus	8
Krautfäule	3
Knollenfäule	7
Krebs	wv1
Nematodenresistenz	Ro1,2,3,4,5
Schorf	6
Viröse Eisenfleckigkeit	6
Blaufleckigkeit	5.5
Durchwuchs	7

Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Zeitig anfangen mit Krautfäulebekämpfung
 Gut ausgereift roden
 Anfällig für grün
 Pflanzkartoffeln nicht abkeimen