

# FAMBO

## Anbauempfehlung



**Verwendung: Pommes/Frisch  
Gute Verarbeitungsqualität**

### Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	DG
Fleischfarbe	6
Knollenform	O
Augentiefe	7
Gleichmäßigkeit der Knollenform	8
Knollengröße	8
Sortierung	7
Trockenstoffgehalt	20.5
Speisequalität	6BC
Keimruhe	6.5

#### Erklärung:


9=positiv ..... 1=negativ  
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß  
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot  
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang  
 Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

### Pflanzabstand:


Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar ( x 1000)
28/35	21	63,5
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
35/45	30	44,4
45/50	35	38,1

### Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



### Lagerung:



7 °C  
4 Monate

### Resistenz:

Blattroll	5.5
A-Virus	R
X-Virus	6
Y-Virus	9
Yntn-virus	5
Krautfäule	3.5
Knollenfäule	8
Krebs	O1
Nematodenresistenz	-
Schorf	7
Viröse Eisenfleckigkeit	7
Blaufleckigkeit	7
Durchwuchs	7

#### Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Kein Sencor verwenden  
 Gut vorkeimen  
 Pflanzgut gegen Rhizotonia behandeln  
 Der Damm hoch und breit aufziehen (grüne Knollen)