

LADY AMARILLA



Anbauempfehlung

Verwendung: Pommes/Frisch

Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	DG
Fleischfarbe	7.5
Knollenform	LO/O
Augentiefe	8
Gleichmäßigkeit der Knollenform	7.5
Knollengröße	7.5
Sortierung	7.5
Trockenstoffgehalt	22.5
Speisequalität	7BC
Keimruhe	7.5

Erklärung:


9=positiv 1=negativ
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
 Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	31	43,0
35/45	35	38,1
35/50	40	33,3
45/50	42	31,7
50/55	44	30,3


Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Stickstoff (N)	200	75	Total	275
Phosphat (P ₂ O ₅)	110			110
Kali (K ₂ O)	230			230

Lagerung:



6 °C
8 Monate

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	6
Yntn-virus	8
Krautfäule	4.5
Knollenfäule	
Krebs	O1
Nematodenresistenz	-
Schorf	5.5
Viröse Eisenfleckigkeit	8
Blaufleckigkeit	9
Durchwuchs	8

Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1