

# LADY AMARILLA

## Anbauempfehlung



Verwendung: Pommes-frites

### Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	DG
Fleischfarbe	7.5
Knollenform	LO/O
Augentiefe	8
Gleichmäßigkeit der Knollenform	7.5
Knollengröße	7.5
Sortierung	7.5
Trockenstoffgehalt	22.5
Speisequalität	7BC
Keimruhe	8


Erklärung:  
 9=positiv ..... 1=negativ  
 Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß  
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot  
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang  
 Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

### Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar ( x 1000)
28/35	31	43,0
35/50	40	33,3
35/55	42	31,7


### Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen ( B, Mg, Mn, S )

### Lagerung:



5 °C  
9 Monate

### Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	6
Yntn-virus	7
Krautfäule	4.5
Krebs	r1
Nematodenresistenz	-
Schorf	5.5
Viröse Eisenfleckigkeit	8
Blaufleckigkeit	9
Durchwuchs	8

Erklärung:  
 R=resistent.....1=sehr anfällig  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (w) r1= (wenig anfällig) Resistent Krebs Fysio 1

Empfindlich gegen Alternaria, zeitig anfangen mit Alternariabekämpfung.  
 Beim Anbau auf leichten Böden, bitte Beregnung beachten.