

# LADY BLANCA

## Anbauempfehlung



Verwendung: Pommes-frites

### Eigenschaften:

Reifezeit	7.8
Schalenfarbe	LR
Fleischfarbe	4.5
Knollenform	L
Augentiefe	8
Gleichmäßigkeit der Knollenform	7
Knollengröße	7.5
Sortierung	7
Trockenstoffgehalt	20.5
Speisequalität	7AB
Keimruhe	7


Erklärung:  
 9=positiv ..... 1=negativ  
 Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß  
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot  
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang  
 Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

### Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand:	Pflanzen/Hektar ( x 1000)
	75 cm	
28/35	27	49,4
35/45	34	39,2
45/50	38	35,1
50/55 CUT	30	44,4

### Düngungsempfehlung (Kg/Ha):


abhängig vom Bodenvorrat



Stickstoff (N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total
Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110			50		25				275
Kali (K <sub>2</sub> O)	230									110
										230

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen ( B, Mg, Mn, S )

### Lagerung:



6 °C  
8 Monate

### Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	5.5
Yntn-virus	7
Krautfäule	3.5
Krebs	r1
Nematodenresistenz	-
Schorf	5
Viröse Eisenfleckigkeit	7
Blaufleckigkeit	8
Durchwuchs	7.5

Erklärung:  
 R=resistent.....1=sehr anfällig  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (w) r1= (wenig anfällig) Resistent Krebs Fysio 1

Leichte Böden sind weniger geeignet für den Anbau  
 Empfindlich gegen Alternaria, zeitig anfangen mit Alternariabekämpfung.  
 Achten Sie auf Magnesiummangel  
 Vorsicht mit Sencor, nur im Voraufbau verwenden