

LADY BLANCA



Anbauempfehlung

Verwendung: Pommes-frites
Früh verwendbar

Eigenschaften:

Reifezeit	7.8
Schalenfarbe	LR
Fleischfarbe	4.5
Knollenform	L
Augentiefe	8
Gleichmäßigkeit der Knollenform	7
Knollengröße	7.5
Sortierung	7
Trockenstoffgehalt	20.5
Speisequalität	7AB
Keimruhe	6.5

Erklärung:


9=positiv 1=negativ
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
 Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:


Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	30	44,4
35/45	34	39,2
35/50	36	37,0
45/50	40	33,3
50/55	42	31,7

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Lagerung:



6 °C
8 Monate

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	7
Yntn-virus	9
Krautfäule	3.5
Knollenfäule	7
Krebs	O1
Nematodenresistenz	-
Schorf	5
Viröse Eisenfleckigkeit	7
Blaufleckigkeit	8
Durchwuchs	7.5

Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Breite Dämme aufziehen um grüne Knollen vorzubeugen
 Leichte Böden sind weniger geeignet für den Anbau