

LADY CHRISTL



Anbauempfehlung

**Verwendung: Speisekartoffel
Früh mit schöner Schale**

Eigenschaften:

Reifezeit	8.5
Schalenfarbe	G
Fleischfarbe	7
Knollenform	LO
Augentiefe	9
Gleichmäßigkeit der Knollenform	8
Knollengröße	7
Sortierung	7
Trockenstoffgehalt	18.5
Speisequalität	8A/AB
Keimruhe	4.5

Erklärung:


9=positiv 1=negativ
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
 Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	20	66,7
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2


Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Stickstoff (N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total	250
Phosphat (P ₂ O ₅)	110										110
Kali (K ₂ O)	230										230

Lagerung:



5 °C
6 Monate

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	9
X-Virus	7
Y-Virus	9
Yntn-virus	R
Krautfäule	2.5
Knollenfäule	8
Krebs	O1
Nematodenresistenz	Ro1
Schorf	7.5
Viröse Eisenfleckigkeit	6
Blaufleckigkeit	6.5
Durchwuchs	7.5

Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Anfällig für Sencor (1 Kg/Hectare) Voraufauf.
 Nicht vorkeimen
 Beuge Rhizoctonia vor
 Auf leichterem, wenig nachlieferendem Boden kann dritte N-Gabe sinnvoll sein
 Achten Sie auf Magnesiummangel
 Gut ausgereift roden
 Aufpassen vor Silberschorf
 Vorsicht mit Keimremmitteln während der Einlagerung !