

LADY ROSETTA



Anbauempfehlung

Verwendung: Chips

Eigenschaften:

Reifezeit	7
Schalenfarbe	R
Fleischfarbe	6
Knollenform	R
Augentiefe	6
Gleichmäßigkeit der Knollenform	8.5
Knollengröße	7
Sortierung	8.5
Trockenstoffgehalt	25
Speisequalität	7C
Keimruhe	5.5

Erklärung:


9=positiv 1=negativ
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R=rot
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
 Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:


Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
25/28	16	83,3
28/35	19	70,2
35/50	27	49,4
35/55	29	46,0
50/55	33	40,4
50/60	35	38,1
55/60	40	33,3

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Lagerung:



8 °C
4 Monate

Resistenz:

Blattroll	6
A-Virus	R
X-Virus	R
Y-Virus	7.5
Yntn-virus	8
Krautfäule	3
Knollenfäule	5.5
Krebs	wv1
Nematodenresistenz	Ro1,4
Schorf	6
Viröse Eisenfleckigkeit	7.5
Blaufleckigkeit	5
Durchwuchs	7.5

Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Pflanzgut keimgestimmt pflanzen
 Zeitig anfangen mit Krautfäulebekämpfung
 Gut ausgereift roden
 Nach dem Roden direkt trockenblasen
 Beuge mechanische Beschädigung vor (Graufleckigkeit)