

MURATO



Anbauempfehlung

Verwendung: Rotschalige Speisesorte Export

Eigenschaften:

Reifezeit	6
Schalenfarbe	R
Fleischfarbe	6
Knollenform	LO
Augentiefe	8
Gleichmäßigkeit der Knollenform	7
Knollengröße	7
Sortierung	7
Trockenstoffgehalt	20.7
Speisequalität	6B
Keimruhe	5

Erklärung:


9=positiv 1=negativ
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R=rot
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
 Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:


	Reihenabstand:	
Maß:	75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
35/55	30	44,4

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Lagerung:



6 °C
4 Monate

Resistenz:

Blattroll	6
A-Virus	
X-Virus	
Y-Virus	7
Yntn-virus	
Krautfäule	4
Knollenfäule	7
Krebs	-
Nematodenresistenz	Ro1,4
Schorf	6
Viröse Eisenfleckigkeit	8
Blaufleckigkeit	5
Durchwuchs	7

Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Nicht zu früh pflanzen im kalten Boden
 Beuge mechanische Beschädigung vor (Graufleckigkeit)
 Kein Sencor verwenden