

# ORCHESTRA



## Anbauempfehlung

## Verwendung: Speisekartoffel

### Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	LG
Fleischfarbe	6.5
Knollenform	RO/O
Augentiefe	7.5
Gleichmäßigkeit der Knollenform	8.5
Knollengröße	8
Sortierung	8
Trockenstoffgehalt	17.5
Speisequalität	7.5A
Keimruhe	5.5

#### Erklärung:


9=positiv ..... 1=negativ  
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß  
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot  
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang  
 Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

### Pflanzabstand:


Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar ( x 1000)
28/35	24	55,6
35/45	30	44,4
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
45/50	35	38,1
50/55	37	36,0

### Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



### Lagerung:



5 °C  
6 Monate

### Resistenz:

Blattroll	9
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	9
Yntn-virus	R
Krautfäule	3.5
Knollenfäule	
Krebs	wvO1
Nematodenresistenz	Ro1
Schorf	7
Viröse Eisenfleckigkeit	8
Blaufleckigkeit	7
Durchwuchs	8

#### Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (wv)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Keine Sencor verwenden, sehr empfindlich  
 Vorsicht mit Keimremmungsmittel während der Einlagerung !