ORCHESTRA

Anbauempfehlung

Verwendung: Speisekartoffel

29-05-2006

Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	LG
Fleischfarbe	6.5
Knollenform	RO/O
Augentiefe	7.5
Gleichmäßigkeit der Knollenform	8.5
Knollengröße	8
Sortierung	8
Trockenstoffgehalt	17.5
Speisequalität	7.5A
Keimruhe	5.5

Erklärung:
9=positiv ..... 1=negativ
Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß
Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
35/50	33	40,4

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



				Total
Stickstoff	(N)	200	50	250
Phosphat	(P_2O_5)	110		110
Kali	(K_2O)	230		230

Lagerung:



5 °C
6 Monate

Resistenz:

Blattroll	9
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	9
Yntn-virus	
Krautfäule	3.5
Knollenfäule	
Krebs	wvO1
Nematodenresistenz	Ro1
Schorf	7
Viröse Eisenfleckigkeit	8
Blaufleckigkeit	7
Durchwuchs	8

Erklärung:
R=resistent.....1=sehr anfällig
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Keine Sencor verwenden, sehr empfindlich

Trotz aller Sorgfältigkeit womit diese Empfehlung zusammengestellt worden ist, ist C. Meijer B.V. nicht verantwortlich für negative Anbauergebnisse