SOPRANO

Anbauempfehlung

Verwendung: Speisekartoffel

Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	LG
Fleischfarbe	6.5
Knollenform	L/LO
Augentiefe	8
Gleichmaßigkeit der Knollenform	7
Knollengröße	8
Sortierung	7
Trockenstoffgehalt	19
Speisequalität	8B
Keimruhe	6.5

Erklärung:
9=positiv ..... 1=negativ
Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß
Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



				Total
Stickstoff	(N)	200	50	250
Phosphat	(P_2O_5)	110		110
Kali	(K_2O)	230		230

Um Mangel an Spurenelementen vorzubeugen, diese zeitig ausbringen (B, Mg, Mn, S)

Lagerung:



4 °C
6 Monate

Nicht vorkeimen

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	5
Yntn-virus	7
Krautfäule	4
Krebs	w1
Nematodenresistenz	-
Schorf	4.5
Viröse Eisenfleckigkeit	7
Blaufleckigkeit	8
Durchwuchs	7.5

Erklärung:
R=resistent.....1=sehr anfällig
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(w) r1= (wenig anfällig) Resistent Krebs Fysio 1

Trotz aller Sorgfältigkeit womit diese Empfehlung zusammengestellt worden ist, ist C. Meijer B.V. nicht verantwortlich für negative Anbauergebnisse