

SOPRANO

Anbauempfehlung



**Verwendung: Speisekartoffel
Grobfallend und ertragreich**

29 mei 2006

Eigenschaften:

Reifezeit	7.5
Schalenfarbe	LG
Fleischfarbe	6.5
Knollenform	L/LO
Augentiefe	8
Gleichmäßigkeit der Knollenform	7
Knollengröße	8
Sortierung	7
Trockenstoffgehalt	19
Speisequalität	8B
Keimruhe	6


Erklärung:
9=positiv 1=negativ
Fleischfarbe : 8=tiebgelb.....4=weiß
Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R= rot
Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang
Kochtyp: A=festkochend D=sehr mehligkochend

Pflanzabstand:


Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar (x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3
50/55	44	30,3
50/60	45	29,6
55/60	46	29,0
50/55 CUT	33	40,4
50/60 CUT	34	39,2
55/60 CUT	35	38,1

Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Lagerung:



4 °C
6 Monate

Resistenz:

Blattroll	7
A-Virus	8
X-Virus	8
Y-Virus	6
Yntn-virus	R
Krautfäule	4
Knollenfäule	7
Krebs	O1
Nematodenresistenz	-
Schorf	5.5
Viröse Eisenfleckigkeit	7
Blaufleckigkeit	7
Durchwuchs	7.5

Erklärung:
R=resistent.....1=sehr anfällig
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Nicht vorkeimen