

# TURBO

## Anbauempfehlung



## Verwendung: Speisekartoffel

### Eigenschaften:

Reifezeit	7.0
Schalenfarbe	LG
Fleischfarbe	6
Knollenform	LO
Augentiefe	7
Gleichmäßigkeit der Knollenform	7
Knollengröße	7.5
Sortierung	6.5
Trockenstoffgehalt	21
Speisequalität	7BC
Keimruhe	6

#### Erklärung:


9=positiv ..... 1=negativ  
 Fleischfarbe : 8=tiefgelb.....4=weiß  
 Schalenfarbe: L=hell, D=dunkel, W=weiß, G=gelb, R=rot  
 Knollenform: R=rund, O=oval, L=lang  
 Kochtyp: A=festkochend ..... D=sehr mehligkochend

### Pflanzabstand:

Maß:	Reihenabstand: 75 cm	Pflanzen/Hektar ( x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
35/55	30	44,4
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2


### Düngungsempfehlung (Kg/Ha):

abhängig vom Bodenvorrat



Stickstoff (N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total	250
Phosphat (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110										110
Kali (K <sub>2</sub> O)	230										230

### Lagerung:



5 °C  
7 Monate

### Resistenz:

Blattroll	4
A-Virus	7.5
X-Virus	6
Y-Virus	6.5
Yntn-virus	8
Krautfäule	4.5
Knollenfäule	8
Krebs	O1
Nematodenresistenz	Ro1,2,3
Schorf	7
Viröse Eisenfleckigkeit	5.5
Blaufleckigkeit	8
Durchwuchs	5

#### Erklärung:

R=resistent.....1=sehr anfällig  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1= (wenig anfällig) Krebs Fysio 1

Gut vorkeimen  
 Beuge Rhizoctonia vor  
 Nicht zu früh pflanzen im kalten Boden  
 Anfällig für Sencor ( 1 Kg/Hectare) Vorauflauf.