ACCORD

Recomendaciones de Cultivo

Uso: Patatas Fritas/Patatas de Mesa
Temprana apta para la industria

Características:

Duración de ciclo de producción	7.5
Color de piel	LG
Color de carne	4.5
Forma del tubérculo	RO/O
Profundidad de los ojos	7.5
Regularidad de forma	8
Tamanò de tubérculos	8
Eficiencia de selección	8
Porcentaje de materia seca	21
Calidad de preparación para comer	7BC/C
Duración de dormancia	5

Comentario:
9=positivo .... 1=negativo
Color de carne : 8=amarillo .....4=blanco
Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo
Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo
Tipo para comida: A=firme ....D=muy harinosa

Distancia de plantación

Calibre	Distancia entre hileras 75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	25	53,3
35/50	34	39,2
35/55	37	36,0
50/55	38	35,1
50/60	40	33,3

Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



				Total
Nitrógeno:	(N)	230		230
Fósforo:	(P_2O_5)	110		110
Potasio:	(K_2O)	230	100	330

Conservación:



7 "C
4 Meses

Especial precaución en controles de mildiu
No cosechar antes de que la piel este hecha
Muy sensible al verdeo
No prebrotar antes de sembrar si puede perder la primera brotación

Resistente:

Virus enrollado	7
Virus A	8.5
Virus X	9.5
Virus Y	8
Virus-Yntn	8
Mildiu de hojas	3
Mildiu de tuberculos	7
Enfermedad de wart	wv1
Nematodo de patata	Ro1,2,3,4,5
Sarna común	6
Spraing	6
Sensibilidad al golpeo	5.5
Sensibilidad al crecimiento segundo	7

Comentario:
R=Resistencia …1 = Muy susceptible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1=poco sensible a wart

C.Meijer b.v. no será responsable sobre posibles efectos negativos que resulten de éstas recomendaciones.