

CUPIDO



Recomendaciones de Cultivo

Uso: Patata de Mesa
Tubérculos grandes y temprana

Características:

Duración de ciclo de producción	8.0
Color de piel	LG
Color de carne	6.5
Forma del tubérculo	O
Profundidad de los ojos	9
Regularidad de forma	8
Tamaño de tubérculos	7.5
Eficiencia de selección	8
Porcentaje de materia seca	20
Calidad de preparación para comer	7AB
Duración de dormancia	8


Comentario:
9=positivo 1=negativo
Color de carne : 8=amarillo4=blanco
Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo
Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo
Tipo para comida: A=firmeD=muy harinosa

Distancia de plantación


Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	18	74,1
35/45	25	53,3
35/50	27	49,4
35/55	28	47,6
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4

Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



Conservación:



4 °C
7 Meses

Resistente:

Virus enrollado	6
Virus A	9
Virus X	9.5
Virus Y	9.5
Virus-Yntn	R
Mildiu de hojas	2.5
Mildiu de tuberculos	6
Enfermedad de wart	O1
Nematodo de patata	Ro1
Sarna común	5
Spraing	8
Sensibilidad al golpeo	6.5
Sensibilidad al crecimiento segundo	7

Comentario:
R=Resistencia ...1 = Muy susceptible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(ww)O1=poco sensible a wart

No aconsejamos sembrar en suelo frío
No espere brotes demasiado largos antes de sembrar
No cosechar antes de que la piel este hecha
Cuidado de bien ventilar las patatas después de cosechar