

FAMBO



Recomendaciones de Cultivo

Uso: Patatas Fritas/Patatas de Mesa Buena calidad de procesamiento

Cruce: OSTARA x PROVITA

Características:

Duración de ciclo de producción	7.5
Color de piel	DG
Color de carne	6
Forma del tubérculo	O
Profundidad de los ojos	7
Regularidad de forma	8
Tamaño de tubérculos	8
Eficiencia de selección	7
Porcentaje de materia seca	20.5
Calidad de preparación para comer	6BC
Duración de dormancia	6.5

Comentario:


9=positivo 1=negativo
 Color de carne : 8=amarillo4=blanco
 Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo
 Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo
 Tipo para comida: A=firmeD=muy harinosa

Distancia de plantación


Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	21	63,5
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
35/45	30	44,4
45/50	35	38,1

Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



Conservación:



7 °C
4 Meses

Resistente:

Virus enrollado	5.5
Virus A	R
Virus X	6
Virus Y	9
Virus-Yntn	5
Mildiu de hojas	3.5
Mildiu de tuberculos	8
Enfermedad de wart	O1
Nematodo de patata	-
Sarna común	7
Spraing	7
Sensibilidad al golpeo	7
Sensibilidad al crecimiento segundo	7

Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1=poco sensible a wart

No utilice Sencor
 Aconsejamos pre-brotar antes de la siembra
 Evita Rizoctonia
 El lomo debería ser de forma ancha