

# LADY OLYMPIA



## Recomendaciones de Cultivo

**Uso: Patatas Fritas/Patatas de Mesa  
Para largo almacenaje**

### Características:

Duración de ciclo de producción	6.5
Color de piel	G
Color de carne	7
Forma del tubérculo	LO
Profundidad de los ojos	7
Regularidad de forma	7
Tamaño de tubérculos	8
Eficiencia de selección	7.5
Porcentaje de materia seca	22.5
Calidad de preparación para comer	7C
Duración de dormancia	6.5

#### Comentario:


9=positivo .... 1=negativo  
 Color de carne : 8=amarillo .....4=blanco  
 Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo  
 Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo  
 Tipo para comida: A=firme ....D=muy harinosa

### Distancia de plantación


Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	31	43,0
35/45	35	38,1
35/50	40	33,3
45/50	42	31,7
50/55	44	30,3

### Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



### Conservación:



6 °C  
8 Meses

### Resistente:

Virus enrollado	7
Virus A	9
Virus X	9
Virus Y	8.5
Virus-Yntn	7
Mildiu de hojas	3
Mildiu de tuberculos	5
Enfermedad de wart	O1
Nematodo de patata	-
Sarna común	6.5
Spraing	7
Sensibilidad al golpeo	7.5
Sensibilidad al crecimiento segundo	6

#### Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1=poco sensible a wart

Sensible a la dosis completa de sencor en pre-emergencia  
 Espera para que haya movimiento de los ojos antes de sembrar  
 Especial precaución en controles de mildiu  
 No cosechar antes de que la piel este hecha  
 Cuidado de bien ventilar las patatas después de cosechar