

LADY AMARILLA

Recomendaciones de Cultivo



Uso: Patatas fritas

Características:

Duración de ciclo de producción	7.5
Color de piel	DG
Color de carne	7.5
Forma del tubérculo	LO/O
Profundidad de los ojos	8
Regularidad de forma	7.5
Tamaño de tubérculos	7.5
Eficiencia de selección	7.5
Porcentaje de materia seca	22.5
Calidad de preparación para comer	7BC
Duración de dormancia	8

Comentario:

9=positivo 1=negativo

Color de carne : 8=amarillo4=blanco

Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo

Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo


Tipo para comida: A=firmeD=muy harinosa

Distancia de plantación

Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	31	43,0
35/50	40	33,3
35/55	42	31,7


Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



Para evitar la falta de nutrientes minerales, aplique los siguientes elementos en su debido momento (B, Mg, Mn, S)

Conservación:



5 °C
9 Meses

Resistente:

Virus enrollado	7
Virus A	8
Virus X	8
Virus Y	6
Virus-Yntn	7
Mildiu de hojas	4.5
Enfermedad de wart	r1
Nematodo de patata	-
Sarna común	5.5
Spraing	8
Sensibilidad al golpeo	9
Sensibilidad al crecimiento segundo	8

Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(w) r1=(poco sensible) resistente a wart

Susceptible al Alternaria, especial precaución en controles de Alternaria.
Garantizar el suministro de agua en suelos ligeros.