MURATO

Recomendaciones de Cultivo

Uso: Patata de mesa roja
Exportación

Características:

Duración de ciclo de producción	6
Color de piel	R
Color de carne	6
Forma del tubérculo	LO
Profundidad de los ojos	8
Regularidad de forma	7
Tamanò de tubérculos	7
Eficiencia de selección	7
Porcentaje de materia seca	20.7
Calidad de preparación para comer	6B
Duración de dormancia	5

Comentario:
9=positivo .... 1=negativo
Color de carne : 8=amarillo .....4=blanco
Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo
Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo
Tipo para comida: A=firme ....D=muy harinosa

Distancia de plantación

Calibre	Distancia entre hileras 75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
35/55	30	44,4

Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



				Total
Nitrógeno:	(N)	225	50	275
Fósforo:	(P_2O_5)	110		110
Potasio:	(K_2O)	230	100	330

Conservación:



6 "C
4 Meses

Resistente:

Virus enrollado	6
Virus A	
Virus X	
Virus Y	7
Virus-Yntn	
Mildiu de hojas	4
Mildiu de tuberculos	7
Enfermedad de wart	-
Nematodo de patata	Ro1,4
Sarna común	6
Spraing	8
Sensibilidad al golpeo	5
Sensibilidad al crecimiento segundo	7

Comentario:
R=Resistencia …1 = Muy susceptible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1=poco sensible a wart

No aconsejamos sembrar en suelo frio
Evita golpeo
No utilize Sencor

C.Meijer b.v. no será responsable sobre posibles efectos negativos que resulten de éstas recomendaciones.