

ORCHESTRA

Recomendaciones de Cultivo



Uso: Patata de Mesa

Características:

Duración de ciclo de producción	7.5
Color de piel	LG
Color de carne	6.5
Forma del tubérculo	RO/O
Profundidad de los ojos	7.5
Regularidad de forma	8.5
Tamaño de tubérculos	8
Eficiencia de selección	8
Porcentaje de materia seca	17.5
Calidad de preparación para comer	7.5A
Duración de dormancia	6

Comentario:

9=positivo 1=negativo

Color de carne : 8=amarillo4=blanco

Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo

Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo


Tipo para comida: A=firmeD=muy harinosa

Distancia de plantación

Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	24	55,6
35/45	30	44,4
45/50	35	38,1
50/55	37	36,0


Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



Para evitar la falta de nutrientes minerales, aplique los siguientes elementos en su debido momento (B, Mg, Mn, S)

Conservación:



5 °C
6 Meses

Resistente:

Virus enrollado	9
Virus A	8
Virus X	8
Virus Y	9
Virus-Yntn	R
Mildiu de hojas	3.5
Enfermedad de wart	r1
Nematodo de patata	Ro1
Sarna común	7
Spraing	8
Sensibilidad al golpeo	7
Sensibilidad al crecimiento segundo	7

Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(w) r1=(poco sensible) resistente a wart