

SOPRANO

Recomendaciones de Cultivo



Uso: Patata de Mesa

Características:

Duración de ciclo de producción	7.5
Color de piel	LG
Color de carne	6.5
Forma del tubérculo	L/LO
Profundidad de los ojos	8
Regularidad de forma	7
Tamaño de tubérculos	8
Eficiencia de selección	7
Porcentaje de materia seca	19
Calidad de preparación para comer	8B
Duración de dormancia	6.5

Comentario:

9=positivo 1=negativo

Color de carne : 8=amarillo4=blanco

Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo

Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo


Tipo para comida: A=firmeD=muy harinosa

Distancia de plantación

Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha (x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3


Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



Para evitar la falta de nutrientes minerales, aplique los siguientes elementos en su debido momento (B, Mg, Mn, S)

Conservación:



4 °C
6 Meses

Resistente:

Virus enrollado	7
Virus A	8
Virus X	8
Virus Y	5
Virus-Yntn	7
Mildiu de hojas	4
Enfermedad de wart	w1
Nematodo de patata	-
Sarna común	4.5
Spraing	7
Sensibilidad al golpeo	8
Sensibilidad al crecimiento segundo	7.5

Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(w) r1=(poco sensible) resistente a wart

No pre-germinación de las semillas