

# TURBO



## Recomendaciones de Cultivo

Uso: Patata de Mesa

Cruce: SM 69-17 x VE 74-45

### Características:

Duración de ciclo de producción	7.0
Color de piel	LG
Color de carne	6
Forma del tubérculo	LO
Profundidad de los ojos	7
Regularidad de forma	7
Tamaño de tubérculos	7.5
Eficiencia de selección	6.5
Porcentaje de materia seca	21
Calidad de preparación para comer	7BC
Duración de dormancia	6

#### Comentario:


9=positivo .... 1=negativo  
 Color de carne : 8=amarillo .....4=blanco  
 Color de piel: L=claro, D=oscuro, W=blanco, G=amarillo, R=rojo  
 Forma del tubérculo : R=redondo, O=oval, L=largo  
 Tipo para comida: A=firme ....D=muy harinosa

### Distancia de plantación


Calibre	Distancia entre hileras	
	75 cm	Plantas/Ha ( x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
35/55	30	44,4
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2

### Abono (Kg/Ha):

Depende de los nutrientes ya presentes en el suelo



### Conservación:



5 °C  
7 Meses

### Resistente:

Virus enrollado	4
Virus A	7.5
Virus X	6
Virus Y	6.5
Virus-Yntn	8
Mildiu de hojas	4.5
Mildiu de tuberculos	8
Enfermedad de wart	O1
Nematodo de patata	Ro1,2,3
Sarna común	7
Spraing	5.5
Sensibilidad al golpeo	8
Sensibilidad al crecimiento segundo	5

#### Comentario:

R=Resistencia ...1 = Muy susceptible  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1=poco sensible a wart

Aconsejamos pre-brotar antes de la siembra  
 Evitar rizoctonia  
 No aconsejamos sembrar en suelo frío  
 Sensible a la dosis completa de sencor en pre-emergencia