

Utilisation: Frites / Consommation Idéale pour une transformation précoce

Caractéristiques:

| | |
|------------------------------|-------|
| Maturité | 7.5 |
| Couleur de la peau | LG |
| Couleur de la chair | 4.5 |
| Forme du tubercule | RO/O |
| Profondeur des yeux | 7.5 |
| Régularité du tubercule | 8 |
| Grosseur des tubercules | 8 |
| Calibrage | 8 |
| Pourcentage de matière sèche | 21 |
| Qualité culinaire | 7BC/C |
| Dormance | 5 |

Commentaires:

9 = positif 1 = négatif

Couleur de chair: 8 = jaune foncée 4 = blanche

Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge

Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long


Qualité culinaire: A=ferme D=très farineuse

Distance entre les plants


| Taille | écartem. des rangées | |
|--------|----------------------|----------------------------|
| | 75 cm | Plants/hectare (x 1000) |
| 28/35 | 25 | 53,3 |
| 35/50 | 34 | 39,2 |
| 35/55 | 37 | 36,0 |
| 50/55 | 38 | 35,1 |
| 50/60 | 40 | 33,3 |

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à effectuer en fonction des reliquats



Stockage:



7 °C
4 mois

Résistance:

| | |
|--------------------------|-------------|
| Virus d'enroulement | 7 |
| Virus -A | 8.5 |
| Virus-X | 9.5 |
| Virus-Y | 8 |
| Virus-Yntn | 8 |
| Mildiou du feuillage | 3 |
| Mildiou du tubercule | 7 |
| Galle véruqueuse | wv1 |
| Nématode doré | Ro1,2,3,4,5 |
| Galle commune | 6 |
| Virus du rattle du tabac | 6 |
| Bleuissement | 5.5 |
| Repousse | 7 |

Commentaires:

R= résistant1 = très sensible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps
Attendre que la peau se soit bien formée avant d'arracher
Très sensible au verdissement
Ne pas dégermer avant plantation