

FAMBO

Conseils de culture



Utilisation: Frites / Consommation Bonne aptitude à la transformation

Caractéristiques:

Maturité	7.5
Couleur de la peau	DG
Couleur de la chair	6
Forme du tubercule	O
Profondeur des yeux	7
Régularité du tubercule	8
Grosseur des tubercules	8
Calibrage	7
Pourcentage de matière sèche	20.5
Qualité culinaire	6BC
Dormance	6.5

Commentaires:


9 = positif 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	21	63,5
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
35/45	30	44,4
45/50	35	38,1


Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à effectuer en fonction des reliquats



Azote:	(N)	200	↓	↓	↓	50	↓	↓	↓	↓	↓	Total
Phosphate:	(P ₂ O ₅)	110										250
Potasse:	(K ₂ O)	230										110
												230

Stockage:



7 °C
4 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	5.5
Virus -A	R
Virus-X	6
Virus-Y	9
Virus-Yntn	5
Mildiou du feuillage	3.5
Mildiou du tubercule	8
Galle véruqueuse	O1
Nématode doré	-
Galle commune	7
Virus du rattle du tabac	7
Bleuissement	7
Repousse	7

Commentaires:

R= résistant1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(ww)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Ne pas utiliser de Sencoral
Stimuler suffisamment le développement des germes
Empêcher le Rhizoctonia
Butte doit être large à son sommet, afin de réduire le problème de vert