LADY AMARILLA

Conseils de culture

Utilisation: Frites / Consommation

Caractéristiques:

Maturité	7.5
Couleur de la peau	DG
Couleur de la chair	7.5
Forme du tubercule	LO/O
Profondeur des yeux	8
Régularité du tubercule	7.5
Grosseur des tubercules	7.5
Calibrage	7.5
Pourcentage de matière sèche	22.5
Qualité culinaire	7BC
Dormance	7.5

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	31	43,0
35/45	35	38,1
35/50	40	33,3
45/50	42	31,7
50/55	44	30,3

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



				Total
Azote:	(N)	200	75	275
Phosphate:	(P_2O_5)	110		110
Potasse:	(K_2O)	230		230

Stockage:



6 °C
8 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	7
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	6
Virus-Yntn	8
Mildiou du feuillage	4.5
Mildiou du tubercule	
Galle véruqueuse	O1
Nématode doré	-
Galle commune	5.5
Virus du rattle du tabac	8
Bleuissement	9
Repousse	8

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils