LADY ANNA

Conseils de culture

Utilisation: Frites
Résistant au Globodera pallida

Caractéristiques:

Maturité	6.5
Couleur de la peau	G
Couleur de la chair	7.0
Forme du tubercule	L
Profondeur des yeux	7
Régularité du tubercule	7
Grosseur des tubercules	7
Calibrage	7
Pourcentage de matière sèche	23
Qualité culinaire	7.5B
Dormance	7.5

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	30	44,4
35/45	38	35,1
45/50 CUT	40	33,3
50/55 CUT	42	31,7

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



				Total
Azote:	(N)	200	50	250
Phosphate:	(P_2O_5)	110		110
Potasse:	(K_2O)	230		230

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, S)

Stockage:



6 °C
8 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	7
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	7
Virus-Yntn	8
Mildiou du feuillage	4.5
Galle véruqueuse	r1
Nématode doré	Ro1,2,3,Pa2
Galle commune	7
Virus du rattle du tabac	
Bleuissement	9
Repousse	7

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(w) r1 = (peu sensible) résistant à la galle véruqueuse physio 1

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils