

LADY BLANCA

Conseils de culture



Utilisation: Frites

Caractéristiques:

Maturité	7.8
Couleur de la peau	LR
Couleur de la chair	4.5
Forme du tubercule	L
Profondeur des yeux	8
Régularité du tubercule	7
Grosseur des tubercules	7.5
Calibrage	7
Pourcentage de matière sèche	20.5
Qualité culinaire	7AB
Dormance	7

Commentaires:

9 = positif 1 = négatif

Couleur de chair: 8 = jaune foncée 4 = blanche

Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge

Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long


Qualité culinaire: A=ferme D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	27	49,4
35/45	34	39,2
45/50	38	35,1
50/55 CUT	30	44,4

Fertilisation (kg/ha):


les apports sont à effectuer en fonction des reliquats



Azote:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total
Phosphate:	(P ₂ O ₅)	110			50		25			275
Potasse:	(K ₂ O)	230								110
										230

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, S)

Stockage:



6 °C
8 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	7
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	5.5
Virus-Yntn	7
Mildiou du feuillage	3.5
Galle véruqueuse	r1
Nématode doré	-
Galle commune	5
Virus du rattle du tabac	7
Bleuissement	8
Repousse	7.5

Commentaires:

R= résistant 1 = très sensible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(w) r1 = (peu sensible) résistant à la galle véruqueuse physio 1

Sols légers conviennent moins bien à cette variété
Sensible au Alternaria. Démarrer le contrôle anti-Alternaria à temps.
Attention aux carences en magnésie
Attention à l'utilisation de Sencoral. Appliquer avant levée