LADY JO

Conseils de culture

Utilisation: Chips
Bonne aptitude à la transformation

Caractéristiques:

Maturité	7.0
Couleur de la peau	G
Couleur de la chair	7
Forme du tubercule	R
Profondeur des yeux	6
Régularité du tubercule	8
Grosseur des tubercules	7
Calibrage	8
Pourcentage de matière sèche	24.5
Qualité culinaire	6CD
Dormance	6

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	18	74,1
35/50	26	51,3
35/55	30	44,4
50/60	35	38,1

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



				Total
Azote:	(N)	200	50	250
Phosphate:	(P_2O_5)	110		110
Potasse:	(K_2O)	230		230

Stockage:



7 °C
5 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	7
Virus -A	7
Virus-X	8
Virus-Y	5.5
Virus-Yntn	7
Mildiou du feuillage	4.5
Mildiou du tubercule	8
Galle véruqueuse	wv1
Nématode doré	Ro1,4
Galle commune	6.5
Virus du rattle du tabac	7
Bleuissement	9.5
Repousse	6

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Attendre le "stade points blancs" avant de planter
Sensible au Sencoral à pleine dose en pre-levée

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils