LADY OLYMPIA

Conseils de culture

Utilisation: Frites / Consommation
Pour un stockage de longue durée

Caractéristiques:

Maturité	6.5
Couleur de la peau	G
Couleur de la chair	7
Forme du tubercule	LO
Profondeur des yeux	7
Régularité du tubercule	7
Grosseur des tubercules	8
Calibrage	7.5
Pourcentage de matière sèche	22.5
Qualité culinaire	7C
Dormance	6.5

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	31	43,0
35/45	35	38,1
35/50	40	33,3
45/50	42	31,7
50/55	44	30,3

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



				Total
Azote:	(N)	225	50	275
Phosphate:	(P_2O_5)	110		110
Potasse:	(K_2O)	230		230

Stockage:



6 °C
8 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	7
Virus -A	9
Virus-X	9
Virus-Y	8.5
Virus-Yntn	7
Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	5
Galle véruqueuse	O1
Nématode doré	-
Galle commune	6.5
Virus du rattle du tabac	7
Bleuissement	7.5
Repousse	6

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Sensible au Sencoral à pleine dose en pre-levée
Attendre le "stade points blancs" avant de planter
Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps
Attendre que la peau se soit bien formée avant d'arracher
Après l'arrachage, sécher les pommes de terre par ventilation

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils