LADY ROSETTA

Conseils de culture

Utilisation: Chips

Caractéristiques:

Maturité	7
Couleur de la peau	R
Couleur de la chair	6
Forme du tubercule	R
Profondeur des yeux	6
Régularité du tubercule	8.5
Grosseur des tubercules	7
Calibrage	8.5
Pourcentage de matière sèche	25
Qualité culinaire	7C
Dormance	5.5

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
25/28	16	83,3
28/35	19	70,2
35/50	27	49,4
35/55	29	46,0
50/55	33	40,4
50/60	35	38,1
55/60	40	33,3

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



				Total
Azote:	(N)	200	75	275
Phosphate:	(P_2O_5)	110		110
Potasse:	(K_2O)	230	100	330

Stockage:



8 °C
4 mois

Attendre le "stade points blancs" avant de planter
Démarrer le contrôle anti-mildiou à temps
Attendre que la peau se soit bien formée avant d'arracher
Après l'arrachage, sécher les pommes de terre par ventilation
Eviter les points noirs

Résistance:

Virus d'enroulement	6
Virus -A	R
Virus-X	R
Virus-Y	7.5
Virus-Yntn	8
Mildiou du feuillage	3
Mildiou du tubercule	5.5
Galle véruqueuse	wv1
Nématode doré	Ro1,4
Galle commune	6
Virus du rattle du tabac	7.5
Bleuissement	5
Repousse	7.5

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils