

ORCHESTRA



Conseils de culture

Utilisation: Pomme de terre de consommation

Caractéristiques:

Maturité	7.5
Couleur de la peau	LG
Couleur de la chair	6.5
Forme du tubercule	RO/O
Profondeur des yeux	7.5
Régularité du tubercule	8.5
Grosseur des tubercules	8
Calibrage	8
Pourcentage de matière sèche	17.5
Qualité culinaire	7.5A
Dormance	5.5


Commentaires:
 9 = positif 1 = négatif
 Couleur de chair: 8 = jaune foncée 4 = blanche
 Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
 Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
 Qualité culinaire: A=ferme D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	24	55,6
35/45	30	44,4
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
45/50	35	38,1
50/55	37	36,0


Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à effectuer en fonction des reliquats



Azote:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total
Phosphate:	(P ₂ O ₅)	110									250
Potasse:	(K ₂ O)	230									110
											230

Stockage:



5 °C
6 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	9
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	9
Virus-Yntn	R
Mildiou du feuillage	3.5
Mildiou du tubercule	
Galle véruqueuse	wvO1
Nématode doré	Ro1
Galle commune	7
Virus du rattle du tabac	8
Bleuissement	7
Repousse	8

Commentaires:
 R= résistant1 = très sensible
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Ne pas utiliser de sencor. Très sensible à la metribuzine
 Pendant la mise en stockage ne pas utiliser d'anti-germinatif