

ORCHESTRA

Conseils de culture



Utilisation: Pomme de terre de consommation

Caractéristiques:

Maturité	7.5
Couleur de la peau	LG
Couleur de la chair	6.5
Forme du tubercule	RO/O
Profondeur des yeux	7.5
Régularité du tubercule	8.5
Grosseur des tubercules	8
Calibrage	8
Pourcentage de matière sèche	17.5
Qualité culinaire	7.5A
Dormance	6

Commentaires:

9 = positif 1 = négatif

Couleur de chair: 8 = jaune foncée 4 = blanche

Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge

Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long


Qualité culinaire: A=ferme D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	24	55,6
35/45	30	44,4
45/50	35	38,1
50/55	37	36,0

Fertilisation (kg/ha):


les apports sont à effectuer en fonction des reliquats



Azote:	(N)	200								Total
Phosphate:	(P ₂ O ₅)	110								250
Potasse:	(K ₂ O)	230								110
										230

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps (B, Mg, Mn, S)

Stockage:



5 °C
6 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	9
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	9
Virus-Yntn	R
Mildiou du feuillage	3.5
Galle véruqueuse	r1
Nématode doré	Ro1
Galle commune	7
Virus du rattle du tabac	8
Bleuissement	7
Repousse	7

Commentaires:

R= résistant 1 = très sensible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(w) r1 = (peu sensible) résistant à la galle véruqueuse physio 1

Ne pas cultiver en sols sensible a la galle commune.

Attention à l'utilisation de Sencoral.

Attention à l'utilisation d'antigerminatif pendant la mise en stockage!

Sensible à la fusariose.