ORCHESTRA

Conseils de culture

Utilisation: Pomme de terre de consommation

Caractéristiques:

Maturité	7.5
Couleur de la peau	LG
Couleur de la chair	6.5
Forme du tubercule	RO/O
Profondeur des yeux	7.5
Régularité du tubercule	8.5
Grosseur des tubercules	8
Calibrage	8
Pourcentage de matière sèche	17.5
Qualité culinaire	7.5A
Dormance	5.5

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	24	55,6
35/45	30	44,4
35/50	32	41,7
35/55	34	39,2
45/50	35	38,1
50/55	37	36,0

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



				Total
Azote:	(N)	200	50	250
Phosphate:	(P_2O_5)	110		110
Potasse:	(K_2O)	230		230

Stockage:



5 °C
6 mois

Résistance:

Virus d'enroulement	9
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	9
Virus-Yntn	R
Mildiou du feuillage	3.5
Mildiou du tubercule	
Galle véruqueuse	wvO1
Nématode doré	Ro1
Galle commune	7
Virus du rattle du tabac	8
Bleuissement	7
Repousse	8

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Ne pas utiliser de sencor. Très sensible à la metribuzine
Attention à l'utilisation d'antigerminatif pendant la mise en stockage!

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils