

# SOPRANO

Conseils de culture



Utilisation: Pomme de terre de consommation

## Caractéristiques:

Maturité	7.5
Couleur de la peau	LG
Couleur de la chair	6.5
Forme du tubercule	L/LO
Profondeur des yeux	8
Régularité du tubercule	7
Grosueur des tubercules	8
Calibrage	7
Pourcentage de matière sèche	19
Qualité culinaire	8B
Dormance	6.5

### Commentaires:

9 = positif . . . . 1 = négatif

Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche

Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge

Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long


Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

## Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare ( x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3

## Fertilisation (kg/ha):


les apports sont à effectuer en fonction des reliquats



Azote:	(N)	200								Total
Phosphate:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110								250
Potasse:	(K <sub>2</sub> O)	230			50					110
										230

Pour éviter les carences minérales, appliquer les éléments suivants à temps ( B, Mg, Mn, S )

## Stockage:



4 °C  
6 mois

## Résistance:

Virus d'enroulement	7
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	5
Virus-Yntn	7
Mildiou du feuillage	4
Galle véruqueuse	w1
Nématode doré	-
Galle commune	4.5
Virus du rattle du tabac	7
Bleuissement	8
Repousse	7.5

### Commentaires:

R= résistant .... 1 = très sensible

Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)

Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)

(w) r1 = (peu sensible) résistant à la galle véruqueuse physio 1

Ne pas stimuler le développement des germes avant de planter