SOPRANO

Conseils de culture

Utilisation: Pomme de terre de consommation
Tubercules gros et rendement élevé

Caractéristiques:

Maturité	7.5
Couleur de la peau	LG
Couleur de la chair	6.5
Forme du tubercule	L/LO
Profondeur des yeux	8
Régularité du tubercule	7
Grosseur des tubercules	8
Calibrage	7
Pourcentage de matière sèche	19
Qualité culinaire	8B
Dormance	6

Commentaires:
9 = positif . . . . 1 = négatif
Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche
Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge
Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long
Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare (x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3
50/55	44	30,3
50/60	45	29,6
55/60	46	29,0
50/55 CUT	33	40,4
50/60 CUT	34	39,2
55/60 CUT	35	38,1

Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à éffectuer en fonction des reliquats



				Total
Azote:	(N)	200	50	250
Phosphate:	(P_2O_5)	110		110
Potasse:	(K_2O)	230		230

Stockage:



4 °C
6 mois

Ne pas stimuler le développement des germes avant de planter

Résistance:

Virus d'enroulement	7
Virus -A	8
Virus-X	8
Virus-Y	6
Virus-Yntn	R
Mildiou du feuillage	4
Mildiou du tubercule	7
Galle véruqueuse	O1
Nématode doré	-
Galle commune	4.5
Virus du rattle du tabac	7
Bleuissement	7
Repousse	7.5

Commentaires:
R= résistant ....1 = très sensible
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

C. Meijer B.V. ne peut être tenu pour responsable des conséquences survenues suite à ces conseils