

# TURBO

## Conseils de culture



### Utilisation: Pomme de terre de consommation

#### Caractéristiques:

Maturité	7.0
Couleur de la peau	LG
Couleur de la chair	6
Forme du tubercule	LO
Profondeur des yeux	7
Régularité du tubercule	7
Grosseur des tubercules	7.5
Calibrage	6.5
Pourcentage de matière sèche	21
Qualité culinaire	7BC
Dormance	6

#### Commentaires:


9 = positif . . . . 1 = négatif  
 Couleur de chair: 8 = jaune foncée .... 4 = blanche  
 Couleur de peau: L=Claire, D=Foncée, W=Blanche, G=Jaune, R=Rouge  
 Forme des tubercules: R=rond, O=ovale, L=long  
 Qualité culinaire: A=ferme .... D=très farineuse

#### Distance entre les plants

Taille	écartem. des rangées 75 cm	Plants/hectare ( x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
35/55	30	44,4
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2


#### Fertilisation (kg/ha):

les apports sont à effectuer en fonction des reliquats



Azote:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Total
Phosphate:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110										250
Potasse:	(K <sub>2</sub> O)	230										110
												230

#### Stockage:



5 °C  
7 mois

#### Résistance:

Virus d'enroulement	4
Virus -A	7.5
Virus-X	6
Virus-Y	6.5
Virus-Yntn	8
Mildiou du feuillage	4.5
Mildiou du tubercule	8
Galle véruqueuse	O1
Nématode doré	Ro1,2,3
Galle commune	7
Virus du rattle du tabac	5.5
Bleuissement	8
Repousse	5

#### Commentaires:

R= résistant ....1 = très sensible  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1 = (peu sensible) à la galle véruqueuse physio 1

Stimuler suffisamment le développement des germes  
 Empêcher le Rhizoctonia solani ( sclérotés noires)  
 Ne pas planter trop tôt dans un sol trop froid  
 Sensible au Sencoral à pleine dose en pre-levée