ACCORD

Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patate fritte / consumo
Precoce adatto per la trasformazione

Caratteristiche:

Maturazione	7.5
Colore della buccia	LG
Colore della pasta	4.5
Forma del tubero	RO/O
Profondità degli occhi	7.5
Regolarità dei tuberi	8
Calibro tubero	8
Calibratura	8
Percentuale di materia secca	21
Qualità di consumo	7BC/C
Dormienza	5

Commenti:
9 = positivo …. 1 = negativo
Colore della pasta: 8 = gialla …. 4 = bianca
Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
Forma del tubero. R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
Tipo di cottura: A = consistente …. D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	25	53,3
35/50	34	39,2
35/55	37	36,0
50/55	38	35,1
50/60	40	33,3

Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



				Totale
Azoto:	(N)	230		230
Fosfato:	(P_2O_5)	110		110
Potassio:	(K_2O)	230	100	330

Stoccaggio:



7 °C
4 Mesi

Trattare in tempo contro la peronospera
Non raccogliere prima della completa maturazione
Molto sensibile all'inverdimento dei tuberi
Non degermogliare i tuberi prima della semina

Resistenza:

Accartocciamento	7
Virus - A	8.5
Virus- X	9.5
Virus-Yn	8
Virus-Yntn	8
Peronospera sul cespo	3
Peronospera sui tuberi	7
cancro	wv1
Nematodo delle patate	Ro1,2,3,4,5
Scabbia comune	6
"spraing"	6
Maculatura blu interna	5.5
Seconda crescita	7

Commenti:
R = Resistente …. 1 = molto sensibile
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

C. Meijer B.V. non è responsabile per le eventuali conseguenze negative derivate dei nostri consigli