

Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patate da consumo fresco Per il mercato biologico

Caratteristiche:

Maturazione	7.0
Colore della buccia	LG
Colore della pasta	5
Forma del tubero	RO
Profondità degli occhi	7
Regolarità dei tuberi	7.5
Calibro tubero	7
Calibratura	9
Percentuale di materia secca	20.1
Qualità di consumo	7ABB
Dormienza	6.5

Commenti:


9 = positivo 1 = negativo
 Colore della pasta: 8 = gialla 4 = bianca
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
 Forma del tubero: R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
 Tipo di cottura: A = consistente D = molto farinosa

Distanza fra le piante


Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	24	55,6
35/50	33	40,4
35/55	36	37,0
50/55	37	36,0
50/60	39	34,2

Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Stoccaggio:



5 °C
7 Mesi

Migliori qualità organolettiche nei terreni con argilla dal 20 al 40%
Svegliare bene il seme

Resistenza:

Accartocciamento	7
Virus - A	8
Virus- X	7
Virus-Yn	8
Virus-Yntn	3
Peronospera sul cespo	9.0
Peronospera sui tuberi cancro	7
Nematodo delle patate	01
Scabbia comune	-
"spraing"	7.5
Maculatura blu interna	6
Seconda crescita	6
	7.0

Commenti:

R = Resistente 1 = molto sensibile
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)