CUPIDO

Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patate da consumo fresco
Precoce e tuberi grossi

Caratteristiche:

Maturazione	8.0
Colore della buccia	LG
Colore della pasta	6.5
Forma del tubero	O
Profondità degli occhi	9
Regolarità dei tuberi	8
Calibro tubero	7.5
Calibratura	8
Percentuale di materia secca	20
Qualità di consumo	7AB
Dormienza	8

Commenti:
9 = positivo …. 1 = negativo
Colore della pasta: 8 = gialla …. 4 = bianca
Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
Forma del tubero. R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
Tipo di cottura: A = consistente …. D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	18	74,1
35/45	25	53,3
35/50	27	49,4
35/55	28	47,6
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4

Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



			Totale
Azoto:	(N)	230	230
Fosfato:	(P_2O_5)	110	110
Potassio:	(K_2O)	230	230

Stoccaggio:



4 °C
7 Mesi

Non seminare presto nei terreni freddi
Prevenire il germoglio troppo forte
Non raccogliere prima della completa maturazione
Dopo la raccolta asciugare le patate al pìu presto mediante ventilazione

Resistenza:

Accartocciamento	6
Virus - A	9
Virus- X	9.5
Virus-Yn	9.5
Virus-Yntn	R
Peronospera sul cespo	2.5
Peronospera sui tuberi	6
cancro	O1
Nematodo delle patate	Ro1
Scabbia comune	5
"spraing"	8
Maculatura blu interna	6.5
Seconda crescita	7

Commenti:
R = Resistente …. 1 = molto sensibile
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

C. Meijer B.V. non è responsabile per le eventuali conseguenze negative derivate dei nostri consigli