LADY CHRISTL

Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patate da consumo fresco
Precoce con una bella buccia

Caratteristiche:

Maturazione	8.5
Colore della buccia	G
Colore della pasta	7
Forma del tubero	LO
Profondità degli occhi	9
Regolarità dei tuberi	8
Calibro tubero	7
Calibratura	7
Percentuale di materia secca	18.5
Qualità di consumo	8A/AB
Dormienza	4.5

Commenti:
9 = positivo …. 1 = negativo
Colore della pasta: 8 = gialla …. 4 = bianca
Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
Forma del tubero. R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
Tipo di cottura: A = consistente …. D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	20	66,7
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2

Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



				Totale
Azoto:	(N)	200	50	250
Fosfato:	(P_2O_5)	110		110
Potassio:	(K_2O)	230		230

Stoccaggio:



5 °C
6 Mesi

Resistenza:

Accartocciamento	7
Virus - A	9
Virus- X	7
Virus-Yn	9
Virus-Yntn	R
Peronospera sul cespo	2.5
Peronospera sui tuberi	8
cancro	O1
Nematodo delle patate	Ro1
Scabbia comune	7.5
"spraing"	6
Maculatura blu interna	6.5
Seconda crescita	7.5

Commenti:
R = Resistente …. 1 = molto sensibile
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
(wv)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

Sensibile al Sencor quando distribuito a dose piena in pre-emergenza
Non pregermogliare
Prevenire la Rhizoctonia
In terreni a bassa mineralizzazione può essere utile l'aumento di ⅓ dell'appor
Probabilità di carenza di magnesio
Non raccogliere prima della completa maturazione
Attenzione alla scabbia argentata
Prestare attenzione all'uso di antigermogliante chimico immediatamente dopo la raccolta

C. Meijer B.V. non è responsabile per le eventuali conseguenze negative derivate dei nostri consigli