

LADY CLAIRE



Consigli per la coltivazione

**Utilizzazione: Patatine
Per lungo stoccaggio**

Caratteristiche:

Maturazione	7.5
Colore della buccia	G
Colore della pasta	7
Forma del tubero	RO
Profondità degli occhi	7.5
Regolarità dei tuberi	7
Calibro tubero	6.5
Calibratura	8
Percentuale di materia secca	23
Qualità di consumo	7BC
Dormienza	7

Commenti:


9 = positivo 1 = negativo
 Colore della pasta: 8 = gialla 4 = bianca
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
 Forma del tubero: R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
 Tipo di cottura: A = consistente D = molto farinosa

Distanza fra le piante


Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
25/28	17	78,4
28/35	19	70,2
35/50	27	49,4
35/55	30	44,4
50/55	36	37,0

Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Stoccaggio:



6 °C
8 Mesi

Resistenza:

Accartocciamento	7
Virus - A	9
Virus- X	7
Virus-Yn	6.5
Virus-Yntn	8
Peronospera sul cespo	2.5
Peronospera sui tuberi	6
cancro	O1
Nematodo delle patate	Ro1
Scabbia comune	6.5
"spraing"	6
Maculatura blu interna	8.5
Seconda crescita	7

Commenti:

R = Resistente 1 = molto sensibile
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

Svegliare bene il seme
 Somministrare minimo il 50% della quota di P in primavera
 Trattare in tempo contro la peronospera
 Sensibile al Sencor quando distribuito a dose piena in pre-emergenza
 Probabilità di carenza di magnesio
 Non raccogliere prima della completa maturazione
 Dopo la raccolta asciugare le patate al più presto mediante ventilazione
 Sensibile ai danni da sovrapposizione dei tuberi nei bins
 Prestare attenzione all'uso di antigermogliante chimico immediatamente dopo la raccolta