

LADY ROSETTA



Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patatine

Caratteristiche:

Maturazione	7
Colore della buccia	R
Colore della pasta	6
Forma del tubero	R
Profondità degli occhi	6
Regolarità dei tuberi	8.5
Calibro tubero	7
Calibratura	8.5
Percentuale di materia secca	25
Qualità di consumo	7C
Dormienza	5.5


Commenti:
 9 = positivo 1 = negativo
 Colore della pasta: 8 = gialla 4 = bianca
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
 Forma del tubero: R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
 Tipo di cottura: A = consistente D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
25/28	16	83,3
28/35	19	70,2
35/50	27	49,4
35/55	29	46,0
50/55	33	40,4
50/60	35	38,1
55/60	40	33,3


Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Azoto:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totale
Fosfato:	(P ₂ O ₅)	110									275
Potassio:	(K ₂ O)	230									330

Stoccaggio:



8 °C
4 Mesi

Resistenza:

Accartocciamento	6
Virus - A	R
Virus- X	R
Virus-Yn	7.5
Virus-Yntn	8
Peronospera sul cespo	3
Peronospera sui tuberi	5.5
cancro	wv1
Nematodo delle patate	Ro1,4
Scabbia comune	6
"spraying"	7.5
Maculatura blu interna	5
Seconda crescita	7.5

Commenti:
 R = Resistente 1 = molto sensibile
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

Svegliare bene il seme
 Trattare in tempo contro la peronospera
 Non raccogliere prima della completa maturazione
 Dopo la raccolta asciugare le patate al più presto mediante ventilazione
 Prevenire maculatura blu interna