

MURATO



Consigli per la coltivazione

Utilizzazione: Patata da consumo fresco con buccia rossa Esportazione

Caratteristiche:

Maturazione	6
Colore della buccia	R
Colore della pasta	6
Forma del tubero	LO
Profondità degli occhi	8
Regolarità dei tuberi	7
Calibro tubero	7
Calibratura	7
Percentuale di materia secca	20.7
Qualità di consumo	6B
Dormienza	5

Commenti:


9 = positivo 1 = negativo
 Colore della pasta: 8 = gialla 4 = bianca
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
 Forma del tubero: R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
 Tipo di cottura: A = consistente D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
35/55	30	44,4


Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Azoto:	(N)	225	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totale	275
Fosfato:	(P ₂ O ₅)	110									110
Potassio:	(K ₂ O)	230				50					330
							100				

Stoccaggio:



6 °C
4 Mesi

Resistenza:

Accartocciamento	6
Virus - A	
Virus- X	
Virus-Yn	7
Virus-Yntn	
Peronospera sul cespo	4
Peronospera sui tuberi	7
cancro	-
Nematodo delle patate	Ro1,4
Scabbia comune	6
"spraing"	8
Maculatura blu interna	5
Seconda crescita	7

Commenti:

R = Resistente 1 = molto sensibile
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (ww)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

Non seminare presto nei terreni freddi
 Prevenire maculatura blu interna
 Non usare Sencor