

ORCHESTRA

Consigli per la coltivazione



Utilizzazione: Patate da consumo fresco

Caratteristiche:

Maturazione	7.5
Colore della buccia	LG
Colore della pasta	6.5
Forma del tubero	RO/O
Profondità degli occhi	7.5
Regolarità dei tuberi	8.5
Calibro tubero	8
Calibratura	8
Percentuale di materia secca	17.5
Qualità di consumo	7.5A
Dormienza	6


Commenti:
 9 = positivo 1 = negativo
 Colore della pasta: 8 = gialla 4 = bianca
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca
 Forma del tubero. R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo
 Tipo di cottura: A = consistente D = molto farinosa

Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	24	55,6
35/45	30	44,4
45/50	35	38,1
50/55	37	36,0

Fertilizzazione (kg/ha) :


Dipende della scorta nel suolo



Azoto:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totale	250
Fosfato:	(P ₂ O ₅)	110									110
Potassio:	(K ₂ O)	230			50						230

Al fine di prevenire delle carenze nutritive minerali, somministrare nei tempi dovuti i seguenti elementi B, Mg, Mn, S.

Stoccaggio:



5 °C
6 Mesi

Resistenza:

Accartocciamento	9
Virus - A	8
Virus- X	8
Virus-Yn	9
Virus-Yntn	R
Peronospera sul cespo	3.5
cancro	r1
Nematodo delle patate	Ro1
Scabbia comune	7
"spraing"	8
Maculatura blu interna	7
Seconda crescita	7

Commenti:
 R = Resistente 1 = molto sensibile
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)
 (w) r1 = (leggero sensibile) resistente al cancro Fysio1

Non coltivare su terreni sensibile al scabbia comune.
 Attenzione all'uso del Sencor.
 Prestare attenzione all'uso di antigermogliante chimico immediatamente dopo la raccolta