

# SOPRANO

Consigli per la coltivazione



Utilizzazione: Patate da consumo fresco

## Caratteristiche:

Maturazione	7.5
Colore della buccia	LG
Colore della pasta	6.5
Forma del tubero	L/LO
Profondità degli occhi	8
Regolarità dei tuberi	7
Calibro tubero	8
Calibratura	7
Percentuale di materia secca	19
Qualità di consumo	8B
Dormienza	6.5


Commenti:  
 9 = positivo .... 1 = negativo  
 Colore della pasta: 8 = gialla .... 4 = bianca  
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca  
 Forma del tubero. R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo  
 Tipo di cottura: A = consistente .... D = molto farinosa

## Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	30	44,4
35/50	38	35,1
35/55	40	33,3


## Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Al fine di prevenire delle carenze nutritive minerali, somministrare nei tempi dovuti i seguenti elementi B, Mg, Mn, S.

## Stoccaggio:



4 °C  
6 Mesi

## Resistenza:

Accartocciamento	7
Virus - A	8
Virus- X	8
Virus-Yn	5
Virus-Yntn	7
Peronospera sul cespo	4
cancro	w1
Nematodo delle patate	-
Scabbia comune	4.5
"spraing"	7
Maculatura blu interna	8
Seconda crescita	7.5

Commenti:  
 R = Resistente .... 1 = molto sensibile  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (w) r1 = (leggero sensibile) resistente al cancro Fysio1

Non pregermogliare