

# TERRA GOLD



## Consigli per la coltivazione

**Utilizzazione: Patate da consumo fresco  
Per il mercato biologico**

### Caratteristiche:

Maturazione	5.5
Colore della buccia	G
Colore della pasta	7.5
Forma del tubero	O
Profondità degli occhi	7
Regolarità dei tuberi	7
Calibro tubero	8.5
Calibratura	7
Percentuale di materia secca	19.0
Qualità di consumo	7.5B/BC
Dormienza	6.5

#### Commenti:


9 = positivo .... 1 = negativo  
 Colore della pasta: 8 = gialla .... 4 = bianca  
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca  
 Forma del tubero: R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo  
 Tipo di cottura: A = consistente .... D = molto farinosa

### Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	18	74,1
35/50	29	46,0
35/55	31	43,0
50/60	35	38,1


### Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Azoto:	(N)	150	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totale	175
Fosfato:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110									110
Potassio:	(K <sub>2</sub> O)	230									230

### Stoccaggio:



5 °C  
8 Mesi

### Resistenza:

Accartocciamento	7
Virus - A	8
Virus- X	8
Virus-Yn	6
Virus-Yntn	3
Peronospera sul cespo	6.5
Peronospera sui tuberi	7
cancro	O1
Nematodo delle patate	Ro1
Scabbia comune	7
"spraing"	7
Maculatura blu interna	9
Seconda crescita	7

#### Commenti:

R = Resistente .... 1 = molto sensibile  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

Pregermogliare bene  
 Se si osserva presenza di peronospora fogliare attivarsi per controllare event  
 Non raccogliere prima della completa maturazione