

# TURBO



## Consigli per la coltivazione

## Utilizzazione: Patate da consumo fresco

### Caratteristiche:

Maturazione	7.0
Colore della buccia	LG
Colore della pasta	6
Forma del tubero	LO
Profondità degli occhi	7
Regolarità dei tuberi	7
Calibro tubero	7.5
Calibratura	6.5
Percentuale di materia secca	21
Qualità di consumo	7BC
Dormienza	6

#### Commenti:


9 = positivo .... 1 = negativo  
 Colore della pasta: 8 = gialla .... 4 = bianca  
 Colore della buccia: L = Chiara, D = Scura, G = Gialla, R = Rossa, W=bianca  
 Forma del tubero: R = Tondeggiante, O = Ovale, L = Lungo  
 Tipo di cottura: A = consistente .... D = molto farinosa

### Distanza fra le piante

Calibro	Distanza tra solchi 75 cm	Piante/ettaro (x 1000)
28/35	19	70,2
35/45	27	49,4
35/50	29	46,0
35/55	30	44,4
45/50	31	43,0
50/55	34	39,2


### Fertilizzazione (kg/ha) :

Dipende della scorta nel suolo



Azoto:	(N)	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	Totale	250
Fosfato:	(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	110									110
Potassio:	(K <sub>2</sub> O)	230									230

### Stoccaggio:



5 °C  
7 Mesi

### Resistenza:

Accartocciamento	4
Virus - A	7.5
Virus- X	6
Virus-Yn	6.5
Virus-Yntn	8
Peronospera sul cespo	4.5
Peronospera sui tuberi	8
cancro	O1
Nematodo delle patate	Ro1,2,3
Scabbia comune	7
"spraing"	5.5
Maculatura blu interna	8
Seconda crescita	5

#### Commenti:

R = Resistente .... 1 = molto sensibile  
 Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
 Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
 (ww)O1 = (poco sensibile) al cancro (Fysio1)

Pregermogliare bene  
 Prevenire la Rhizoctonia  
 Non seminare presto nei terreni freddi  
 Sensibile al Sencor quando distribuito a dose piena in pre-emergenza