

## Teeltadvies consumptie

**Gebruik: Tafelaardappel  
Voor biologische markt**

### Eigenschappen:

Rijptijd	7.0
Schilkleur	LG
Vleeskleur	5
Knolvorm	RO
Ogen	7
Regelmaat knol	7.5
Grootte knol	7
Sortering	9
Drogestof gehalte	20.1
Cons. kwaliteit	7ABB
Kiemrust	6.5


Toelichting:  
9 = gunstig . . . . . 1 = ongunstig  
Vleeskleur: 8 = geel . . . . . 4 = wit  
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood  
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang  
Kooktype: A = vast . . . . . D = zeer melig

### Plantafstand:


Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare ( x 1000)
28/35	24	55,6
35/50	33	40,4
35/55	36	37,0
50/55	37	36,0
50/60	39	34,2

### Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



### Bewaring:



5 °C  
7 maanden

### Resistentie:

Bladrol	7
A-virus	8
X-virus	7
Y-virus	8
Yntn-virus	3
Phytophthora loof	9.0
Phytophthora knol	7
Wratziekte	O1
Aardappelmoehheid	-
Schurft	7.5
Kringerigheid	6
Stootblauw	6
Doorwas	7.0

Toelichting:  
R = resistent .... 1 = zeer vatbaar  
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
(ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Beste cons. kwaliteit op gronden van 20 tot 40% afslibbaar.  
Pootgoed goed los laten komen