

# CUPIDO



## Teeltadvies consumptie

Gebruik: Tafelaardappel  
Grof en vroeg

### Eigenschappen:

Rijptijd	8.0
Schilkleur	LG
Vleeskleur	6.5
Knolvorm	O
Ogen	9
Regelmaat knol	8
Grootte knol	7.5
Sortering	8
Drogestof gehalte	20
Cons. kwaliteit	7AB
Kiemrust	8


Toelichting:  
9 = gunstig . . . . . 1 = ongunstig  
Vleeskleur: 8 = geel . . . . . 4 = wit  
Schilkleur: L=licht D=donker W=wit G=geel R=rood  
Knolvorm: R=Rond O=Ovaal L=Lang  
Kooktype: A = vast . . . . . D = zeer melig

### Plantafstand:


Maat	Rijafstand 75 cm	Planten/hectare ( x 1000)
28/35	18	74,1
35/45	25	53,3
35/50	27	49,4
35/55	28	47,6
45/50	31	43,0
50/55	33	40,4

### Bemestingsadvies (kg/ha):

afhankelijk van de bodemvoorraad



### Bewaring:



4 °C  
7 maanden

### Resistentie:

Bladrol	6
A-virus	9
X-virus	9.5
Y-virus	9.5
Yntn-virus	R
Phytophthora loof	2.5
Phytophthora knol	6
Wratziekte	O1
Aardappelmoehheid	Ro1
Schurft	5
Kringerigheid	8
Stootblauw	6.5
Doorwas	7

### Toelichting:

R = resistent .... 1 = zeer vatbaar  
Ro(x) = Globodera Rostochiensis pathotype (x)  
Pa(x) = Globodera Pallida pathotype (x)  
(ww)O1 = (weinig vatbaar) wratziekte fysio 1

Niet vroeg poten in koude grond  
Voorkom te sterke kieming  
Goed laten afharden voor het rooien  
Na rooien zo snel mogelijk droog ventileren